

LA STERILISATION CHEZ LA CHATTE

Nom technique : OVARIECTOMIE (retrait des ovaires)

Pourquoi stériliser une chatte ?

- Empêcher les **gestations** non souhaitées.
- Limiter la part de **chats errants**. 2 chats non stérilisés engendrent 22 000 chatons sur 4 ans.
- Empêcher les risques liés à la mise bas (dystocie, non délivrance...)
- Empêcher les **affections utérines** (pyomètre)
- Empêcher ou limiter les **affections liées aux hormones** (fibroadénomatose, tumeurs mammaires, grossesse nerveuse).
- Limiter le risque de propagation virale (**sida du chat, FELV**)



Pilule ou stérilisation ?

La prise prolongée de pilule conduit fréquemment à des **pathologies ovariennes** (kystes). L'oubli de la pilule peut engendrer une gestation non désirée.

Les inconvénients liés à la stérilisation chirurgicale sont le prix, l'anesthésie et l'irréversibilité de l'acte.



Dr DURBEC Emilie



Cabinet Vet'Barberol

Conditions préalables à une stérilisation

- Agée au moins de **6 mois**.
- Pour une chatte ayant mis bas, attendre le **sevrage des chatons**.

Déroulement de l'intervention



Réalisation d'une **consultation préstérilisation**, en amont de la chirurgie afin de s'assurer de l'aptitude de la chatte à avoir une anesthésie générale.

La veille au soir de l'intervention, la chatte est **mise à jeun** (retrait de la nourriture à 22h au plus tard).

Entrée de l'animal à la clinique le matin et réalisation de la chirurgie par la suite.

La chatte est récupérée par ses propriétaires le soir même.



Le post-opératoire



L'animal est mis sous **anti-inflammatoires** pendant 5 jours.

Garder la chatte au **calme** jusqu'au retrait des points.

Port de la **collerette** obligatoire afin d'éviter que la chatte se lèche ou arrache ses points.

Retrait des points 12-15 jours après la chirurgie.

Surveiller la plaie.

Complications possibles

Il arrive que des chattes soit gestantes au moment de l'intervention chirurgicale. Dans ce cas, soit on réalise une interruption de gestation en faisant une **ovario-hystérectomie** (retrait des ovaires et de l'utérus). Soit on referme et on laisse la chatte avoir ses chatons.

Des **déhiscences de plaie** sont également possibles.

